



Insuficiența venoasă cronică

RECAPITULARE ȘI CAZURI CLINICE







INSUFICIENȚA VENOASĂ CRONICĂ

Displazii
venoase
congenitale

Varice
hidrostatice
decompensate

Sindromul
postflebitic cu
varice
secundare

Sindromul de
compresie
asupra venelor
profunde



Clasificarea CEAP – boala venoasă cronică

Clasificarea clinică

C0 - fără semne vizibile sau palpabile de
boală venoasă
C1 - telangiectazii sau vene reticulare
C2 - vene varicoase
C3 - edem
C4a - hiperpigmentare și/sau eczemă
C4b - lipodermatoscleroză și/sau atrofie
albă
C5 - ulcer venos vindecat
C6 - ulcer venos activ

Clasificarea etiologică

Ec - boală venoasă
congenitală
Ep - boală venoasă primară
Es - boală venoasă
secundară (sindrom
posttrombotic)
En - fără etiologie venoasă
identificabilă

Clasificarea anatomică

As - vene superficiale
Ap - vene perforante
Ad - vene profunde
An - fără localizare venoasă
identificată

Clasificarea fiziopatologică

Pr - reflux
Po - obstrucție
Pr, o - reflux și obstrucție
Pn - fără fiziopatologie
venoasă identificabilă



Healthy
Leg

C1
Spider Veins

C2
Varicose Veins

C3
Swelling

C4
Skin Changes

C5
Healed Ulcer

C6
Venous Stasis
Ulcer



**TELANGIECTAZII+
VENE VARICOASE**

EDEM + DERMATITĂ PIGMENTARĂ ȘI PURPURICĂ



ECZEMA VARICOASĂ



DERMO-HIPODERMITA SCLEROASĂ



ATROFIA ALBĂ MILIAN



Acroangiodermatită (pseudo-Kaposi)



ULCER VENOS





Cazuri clinice

Pacientă în vârstă de 57 de ani, cunoscută cu IVCP dezvoltată pe varice hidrostactice, se prezintă pentru două ulceratii cu dimensiuni de aproximativ 4/2 cm, respectiv 0,5cm, cu margini neregulate, cu fundul acoperit parțial de depozit fibrinos, înconjurată de tegument hiperpigmentat, cu zone scleroase, localizate la nivel perimaleolar intern.

Alte întrebări adresate pacientei?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Ulcerația membrului inferior

- Evita ortostatismul static prelungit
- Conținție elastică
- Toaletă cu soluții antiseptice
- Debridare chirurgicală cu îndepărtarea parțială a depozitului de fibrină
- Vessel Due 600 ULS injectabil IM, 1f/zi sau comprimate de 250ULS, 2cp/zi
- Detralex 500mg, 2cp/zi
- Pentoxi retard 400mg, 1cp/zi

Rp/ Dermazin cremă
DS. extern, la nivelul ulcerațiilor

Rp/ Diprogenta unguent
DS. extern, periulceros

Rp/ Alindor 500mg
DS. intern, 1cp/zi

Rp/ Pansament cu Clorhexidin
DS. extern, la nivelul ulcerațiilor

Pacient în vârstă de 71 de ani, cunoscut în antecedende cu boală venoasă, se prezintă pentru placard eritemato-violaceu, fisurat, acoperit de scume și cruste, pruriginos, localizat la nivelul gambei.

Alte întrebări adresate pacientului?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Eczemă varicoasă

- Scăderea presiunii venoase
- Îmbunătățirea circulației venoase și limfatice
- Evita ortostatismul static prelungit
- Conținție elastică

Rp/ Acid salicilic |
Ictiol | $\overline{aa}$ 1,5g
Uree 3g
Vitamina A fiole II
Clobetasol cremă tub I
Mf. cremă
DS. Ext, 1 aplicație/zi

Rp/ Xyzal 5mg
DS. Int, 1cp/zi, seara

Pacient în vârstă de 50 de ani, se prezintă pentru traiecte venoase proeminente, tortuase, sinuase, ce se accentuează în ortostatism, însoțite de dureri în timpul mersului și de senzația de picioare grele.

Alte întrebări adresate pacientului?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Varice hidrostatice

- Evită ortostatismul static prelungit
- Conținție elastică
- Venotonice: Detralex/ Vessel Due
- Pentoxifilină
- Prostaglandina E1 / I2
- Acid acetyl salicilic
- **Scleroterapie**
- **Laser-terapie**
- **Cura chirurgicală**
- **Radiofrecvență**

Pacientă în vârstă de 68 de ani, cunoscută cu IVCP din 2001 , se prezintă pentru o ulcerăție gigantică, dispusă circumferențial la nivelul gambei, cu margini neregulate, acoperită de depozit fibrinos, cu zone scleroase și edem la nivelul membrului inferior.

Alte întrebări adresate pacientei?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Ulcerația membrului inferior

- Toaletă cu soluții antiseptice
- Debridare chirurgicală cu îndepărtarea parțială a depozitului de fibrină
- Evita ortostatismul static prelungit
- Conținție elastică
- Pentoxi retard 400mg, 1 cp/zi seara
- Vessel Due 250 ULS, 2 cp/zi sau 600ULS inj im
- Detralex 500mg, 2cp/zi
- +/- antibioterapie
- Stimularea epitelizării și cicatrizării: pomada Mikulicz, comprese/soluții de sulfat de magneziu sau sulfat de zinc

Rp/ Regen-AG cremă
DS. extern, la nivelul ulcerațiilor

Rp/ Alindor 500mg
DS. intern, 1 cp/zi

Rp/ Dermovate cremă
DS. extern, periulceros

Rp/ Pansament cu Clorhexidin
DS. extern, la nivelul ulcerațiilor