

Leziunile elementare secundare

Leziuni elementare secundare

Pierderile de
substanță:
excoriația,
eroziunea,
exulcerația,
ulcerația, fisura

Deșeuri cutanate:
scuama, crusta

Sechele cutanate:
cicatricea, atrofia

Leziunile prin pierdere de substanță

- ▶ Se diferențiază între ele prin profunzimea straturilor cutanate interesate
- ▶ În determinismul acestor leziuni sunt incriminate: traumatismele, factorii chimici, factorii fizici, factorii infecțioși

Excoriația

- ❖ Cea mai superficială lipsă de substanță
- ❖ Se localizează la nivelul stratului cornos și lucidum
- ❖ Are aspectul unei mici zgârieturi liniare

Eroziunea

- ❖ Interesează în profunzime aproape toate straturile epidermului
- ❖ Primitive/ Secundare
- ❖ Persistența la periferia leziunii a unui gulerăș epidermic ➡ eroziune secundară

Exulcerația

- ❖ Mai profundă
- ❖ Afectează epidermul și papilele dermice

Excoriație / Eroziune / Exulcerație



Excoriație / Eroziune / Exulcerație



Excoriație / Eroziune / Exulcerație



Ulcerarea

- ❖ Pierdere de substanță profundă, putând interesa pe lângă epiderm și toate straturile dermului, vindecarea ei realizându-se printr-o cicatrice.


Forme de ulceratii la nivelul feței (localizarea topografică cea mai frecventă)

ulcerarea
trenantă,
nedureroasă

ulcerarea
terebrantă,
distructivă

ulcerarea
fagedenică

Descrierea unei ulcerații



- Evoluția unei ulcerații poate fi favorabilă rezultând o cicatrice (în ulcerațiile traumatice sau postinfecțioase) sau poate să se extindă în profunzime sau suprafață

Ulcerarea



Forme particulare de ulcerații



În cavitatea
bucală,
ulcerațiile pot
îmbrăca un
aspect
particular, fiind
numite afte



la nivelul
organelor
genitale,
ulcerațiile se
localizează mai
ales pe
tegumentul
zonei periano-
genitale



pe membrele
inferioare, mai
ales pe gambe,
ulcerațiile sunt
reprezentative
pentru
tabloul
insuficienței
venoase cronice

Fisura sau ragada

- ❖ Pierdere liniară a continuității cutanate sau mucoase datorată pierderii elasticității sau a unei tensiuni locale excesive
- ❖ Cel mai caracteristic exemplu de ragadă profundă îl reprezintă fisurile și cicatricile din sifilisul congenital precoce




**Deșeurile
cutanate**

*SCUAMELE
CRUSTELE*

Scuamele

- ❖ Se formează din îngroșarea stratului cornos.
- ❖ Au dimensiuni variabile
- ❖ Substratul morfopatologic al scuamelor este hiperkeratoza care poate fi de două feluri: ortokeratozică și parakeratozică.



Scuame

Scuamă groasă



Scuame grăsoase



Scuame

Scuame subțiri



Scuame în lupusul eritematos sistemic



Crusta

- ❖ Produsul de uscare, fie al unei secreții exudative, clare, serocitrine, fie al unei secreții purulente sau sangvinolente de la suprafața tegumentului
- ❖ Unei cruste i se descriu: dimensiunea, culoarea, grosimea (cruste subțiri în piodermizări secundare sau groase în ectimă sau ulcerul de gambă) și aderența
- ❖ Au mai fost descrise și cruste cu aspect particular, cum ar fi: crusta ostreacee, crusta rupioidă



Crusta

Crustă melicerică



Crustă rupioidă



**Sechelele
cutanate**

**CICATRICEA
ATROFIA**

Cicatricea

- ❖ Apare ca rezultat al vindecării unei ulceratii sau a altui proces distructiv care depășește dermul reticular
- ❖ În timp, cicatricile pot deveni hiperpigmentate, brun-cafenii în totalitate sau numai la periferie sau acromice (hipopigmentate) cu nuanțe alb-sidefii



Cicatricile pot
îmbrăca diverse
aspecte clinice

Liniare,
suple

Hipertrofice,
îngroșate

Cheloide

Interstițiale

Cicatricea

Liniară, suplă



Hipertrofică, îngroșată



Cicatricea

Cheloidă




Interstițială



Atrofia

- ❖ Modificare involutivă a tegumentului
- ❖ Tegumentul devine subțire, aproape transparent, decolorat, fără turgor și elasticitate, iar foliculii pilari și glandele anexe sunt rari sau absenți



shutterstock.com • 1079675027

Atrofia



Atrofia la vârstnici



Lupus eritematos



Sclerodermie

Forme particulare de atrofie

Poikilodermia



Vergeturile

