



URTICARIA. ECZEMA. DERMATOZELE BULOASE AUTOIMUNE. ERITEMUL POLIMORF

RECAPITULARE ȘI PREZENTARE DE CAZURI CLINICE

URTICARIA



A. Urticariile induse de factori fizici

Urticaria solară



Urticaria la contactul cu frigul/căldura



Urticaria factitia- Dermografismul




Urticaria la presiune/ vibrații



Urticaria colinergică/ acvagenă/ adrenergică



B. Urticaria de contact




C. Urticaria alimentară



D. Urticaria postmedicamentoasă




Edemul Quincke- angioedemul



ECZEMA

Evoluție clinică



+/- faza de lichenificare



Eczema numulară



Eczema dishidroică



Eczema asteatozică (fisurară)



Eczema infecțioasă



Eczema de stază







DERMATOZE BULOASE AUTOIMUNE




Pemfigus


Pemfigoid



PEMFIGUS VULGAR




PEMFIGOID BULOS





ERITEMUL POLIMORF

ERITEM POLIMORF





Cazuri clinice

Pacient în vârstă de 51 ani, se prezintă pentru apariția de plăci și placarde eritemato-edematoase, intens pruriginoase localizate la nivelul membrelor superioare și toracelui.

Pacientul lucrează de 15 ani în domeniul construcțiilor, unde se ocupă de demolări.

Alte întrebări adresate pacientului?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Urticarie determinată de vibrații

Înteruperea expunerii la vibrații

RP/ Xyzal 5mg
cp XXX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Ichtol	1,5g
Anestezină	
Hidrocortizon acetat fl X	
Talc	
Oxid de zinc	āā 5g
Glicerină 10 g	
Apă distilată ad 100 ml	
Mf. Mixtură	
DS. ext. 1 apl/zi	

Pacientă în vârstă de 32 ani, se prezintă pentru leziuni rotund-ovalare, bine delimitate, eritematoase, alcătuite din papulo-vezicule și cruste, pruriginoase, localizate la nivelul antebrățului.

Alte întrebări adresate pacientei?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Eczemă numulară

Înlăturarea factorilor cauzali
Comprese locale cu Clorhexidin

RP/ Xyzal 5mg
cp XXX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Uree 3g
Ichtiol 0,5g
Vit A cps V
Vit E cps II
Locoid tub I
Mf. Unguent
DS. ext. 1 apl/zi, 10 zile

Pacient în vârstă de 28 ani, se prezintă pentru apariția, în urmă cu 3 zile, a unei erupții cutanate alcătuită din leziuni rotunde, dispuse în cocardă, formate din cercuri concentrice, cu aspect și culori diferite, centrate de o flictenă în tensiune, localizate la nivelul toracelui posterior și a membrelor superioare. Pacientul prezintă febră 38,7C.

Alte întrebări adresate pacientului?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Eritem polimorf

**Toaleta cu solutii antiseptice
Antitermice**

**Corticoterapie: Prednison 1mg/kgc/zi +protecție gastrică
Omez 20mg 1tb/zi**

**Local: Rp/ Eritromicină 3g
Hidrocortizon acetat f X
Talc
Oxid de zinc | aa 10g
Glicerină 15g
Apă distilată ad 100g
Mf. mixtură**

Pacientă în vârstă de 23 ani, se prezintă pentru edem important, în tensiune, la nivelul buzei superioare, apărut în urma unui traumatism minor produs în urmă cu 2 ore, pe parcursul căruia edemul a continuat să se agraveze în ciuda aplicării locale de gheață.


Alte întrebări adresate pacientei?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?





Dg: Angioedem



Hemisuccinat
de
hidrocortizon
injectabil

Pacientă în vârstă de 43 ani, prezintă la nivel abdominal o erupție monomorfă, formată din multiple plăci eritematoase, edematoase, pruriginoase, ce au debutat în urmă cu 2 zile.

Alte întrebări adresate pacientei?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Urticarie acută

Identificarea și înlăturarea factorilor cauzali
Dietă de cruțare

RP/ Xyzal 5mg
cp XX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Mentol 1,5g
Hidrocortizon acetat 0,5g
Talc āā 10g
Oxid de zinc
Glicerină 15 g
Apă distilată ad 100 ml
Mf. Mixtură
DS. ext. 1 apl/zi, la nivelul leziunilor

Pacientă în vârstă de 21 de ani, prezintă o erupție cutanată polimorfă, cu tendință la generalizare, formată din flicte de dimensiuni mari, flasce, cu conținut lichidian serocitrin, dar și purulent, eroziuni și cruste.

Afirmativ, acestea au debutat în urmă cu 2 luni, inițial la nivelul mucoasei bucale.

Alte întrebări adresate pacientei?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Pemfigus vulgar

Toaleta cu solutii antiseptice
Violet de gențiană
Repaus la pat

Puls-terapie cu Metilprednisolon 3 zile +protecție gastrică

Rp/Xyzal 5mg
cp XXX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Oxymed spray
fl I
DS. Ext. aplicatii locale

Rp/ Mometazona cremă tub I
DS. Ext. aplicatii locale

Rp/ Nistatin | aa 1,5g
Neomicina |
Anestezina 2g
Hidrocortizon acetat 0,25g
Pulbere Tragaconta 0,2g
Apa cloroform ad 20 ml
Mf. Mucilagiu
Ds. Ext. badijonaj bucal

Pacientă în vârstă de 42 ani, se prezintă pentru vezicule de dimensiuni mici, eritematoase, cu conținut limpede, serocitrin, intens pruriginoase, dispuse simetric la nivelul palmelor, însoțite de zone acoperite de cruste. Pacienta afirmă că în trecut a mai prezentat leziuni similare, cu aceeași localizare.

Alte întrebări adresate pacientei?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Eczemă dishidroxică

Identificarea și înlăturarea factorilor cauzali

RP/ Xyzal 5mg
cp XXX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Medrol 32 mg
tb X
DS. Int, 1tb/zi 5 zile, apoi se scade
cu 1/4 tb la 2 zile

+protecție gastrică

Rp/ Elocom cremă
tub I
DS. Ext. 1apl/zi

Rp/ Cremă hidratantă
tub I
DS. Ext. 1 aplicație după fiecare spălare

Pacient în vârstă de 55 ani, cunoscut cu insuficiență venoasă cronică de 7 ani, se prezintă pentru leziunile eritemato-veziculo-scuamo-crustoase grupate în plăci și placarde, însoțite de dermită pigmentară și edem, localizate bilateral la nivelul gambelor.

Alte întrebări adresate pacientului?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Eczemă de stază

Conținție elastică
Repaus în clinostatism

RP/ Xyzal 5mg
cp XXX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Triamcinolon S cremă
tub I
DS. Ext. 1apl/zi

Rp/ Acid salicilic 0,5g
Uree 3g
Ictiol 0,75 g
Vit. A cps V
Vit. E cps III
Betaderm tub I
Mf. Unguent
DS. Ext. 1 apl/zi

Copil, 4 ani și 5 luni, prezintă erupție eritemato-edematoasă, cu leziuni izolate și confluate în plăci, pruriginoasă, localizată la nivelul faciesului, regiunii cervicale, toracelui superior și membrilor superioare. Mama afirmă că acestea au apărut la scurt timp după masă.

Alte întrebări adresate mamei?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Urticarie alimentară

Identificarea și înlăturarea factorilor cauzali
Diototerapie

RP/ Xyzal 5mg
cp V
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Mentol 1g
Hidroclorid acetat f X
Talc āā 10g
Oxid de zinc
Glicerină 15 g
Apă distilată ad 100 ml
Mf. Mixtură
DS. ext. 1 apl/zi, la nivelul leziunilor

Pacient în vârstă de 67 ani, se prezintă pentru erupție cutanată pruriginoasă, alcătuită din bule mari, în tensiune, cu conținut lichidian serocitrin, multiple eroziuni și cruste, localizată simetric pe fața de flexie a antebrațelor.

Semnul Nícolsky este absent.


Alte întrebări adresate pacientului?

Investigații?

Diagnostic?

Tratament?





Dg: Pemfigoid bulos

Toaleta cu solutii antiseptice

Corticoterapie: Prednison 1mg/kgc/zi +protecție gastrică

Local: Clobetasol 2 aplicatii/zi

Pacient în vârstă de 73 de ani, se prezintă pentru tegumente uscate, fisurate, eritematoase, acoperite de scuame subțiri, dispuse într-un pattern poligonal, însoțite de prurit, la nivelul fețelor dorsale ale membrelor superioare.

Alte întrebări adresate pacientului?

Diagnostic?

Tratament?



Dg: Eczemă asteatozică

Băi emoliente

Utilizarea de geluri de duș fără săpun

RP/ Xyzal 5mg
cp XXX
DS. Int 1cp/zi

Rp/ Hidrocortizon acetat 1g

Talc

Oxid de zinc

Lanolină

Vaselină

Apă distilată

aa 30g

Mf. cremă

DS. Ext. 1 apl/zi