




SANSA DE SUPRAVIETUIRE IN TRAUMA


PRINCIPII SI LIMITE ALE INTERVENTIEI
LAICE IN TRAUMA



GENERALITĂȚI

- Traumatologia este un segment foarte important de patologie
- Reprezintă cauze importante de mortalitate și invaliditate definitivă
- Determină un procent important de „morți evitabile”
- Timpul reprezintă un element esențial al ecuației
- *ORICE TRAUMATISM ESTE UN CAZ MEDICO - LEGAL*

ȘANSA DE SUPRAVIEȚUIRE ÎN TRAUMĂ



ATENȚIE!!

- ☛ Primul ajutor trebuie să fie calificat chiar dacă nu este totdeauna profesional
- ☛ Salvatorii trebuie să cunoască metodologia de evaluare în traumă
- ☛ Trebuie să recunoască situațiile rapid amenințătoare de viață
- ☛ Trebuie să fie antrenați pentru practicarea unor manevre salvatoare

TERMINOLOGIE

- ☛ **POLITRAUMATISM** - complex lezional general de acțiunea unuia sau mai multor agenți vulneranți asupra corpului, generând leziuni posttraumatice în cel puțin două regiuni anatomice diferite, dintre care **cel puțin una are risc vital** (exemplu – traumatizat toracic și membre cu plagă penetrantă toracică)

TERMINOLOGIE

- ☛ **POLICONTUZIONAT** - rezultat al acțiunii asupra organismului a unui agent vulnerant care determină leziuni în mai multe regiuni topografice, **fără risc vital.**
- ☛ **POLIFRACTURAT** - rezultat al acțiunii asupra organismului a unui agent vulnerant care determină leziuni în mai multe regiuni topografice, **fără risc vital.**

PRIORITĂȚI

- ☛ siguranța este primordială
- ☛ evaluarea scenei accidentului este obligatoriu primul pas practic
- ☛ securizarea, delimitarea, semnalizarea, iluminarea, paza scenei accidentului și devierea traficului sunt gesturi prioritare
- ☛ este extrem de important să fie găsite toate victimele accidentului (este posibil ca unele dintre ele să se afle proiectate la distanță sau să fie îngropate sub dărâmături)

PRIORITĂȚI

- În accidentele cu multe victime triajul inițial este obligatoriu și va decide prioritățile la tratament
- stabilizarea și securizarea vehiculului avariat precedă obligatoriu accesul în acesta și intervenția
- evaluarea primară va fi combinată cu imobilizarea coloanei cervicale odată cu deschiderea căii aeriene
- fractura de coloană cervicală va fi obligatoriu suspicionată la toți politraumatizații cu risc - tratament cu toate precauțiile impuse de prezența unei fracturi de coloană cervicală

PRIORITĂȚI

- măsurile de restabilire și susținere a funcțiilor vitale se instituie imediat ce se descoperă instabilitatea funcțiilor
- primul drog de care au nevoie traumatizații este oxigenul
- managementul ventilației este complex și poate consta în gesturi mici cu impact maxim asupra evoluției
- tahicardia este un semn fidel de hipovolemie, suferință respiratorie sau durere - salvatorul trebuie să caute cu atenție toate sursele și să exercite maxim de control asupra lor

ALTE MĂSURI

- corpii străini profunzi nu se extrag - ei se fixează stabil în poziția în care se află
- plăgile nu se explorează – acoperire cu comprese sterile
- examinarea secundară de îndată ce stabilizarea inițială a fost efectuată,
- imobilizarea fracturilor - gesturi obligatorii cu beneficii imense pentru pacient,
- hipotermia trebuie luată întotdeauna în considerație, ca factor agravant al leziunilor
- reevaluarea frecventă este obligatorie, începându – se mereu de la A.

ALTE REGULI

- comunicarea permanentă cu pacientul pe parcursul acordării primului ajutor este esențială
- pacientul nu va fi transportat spre spital cu mijloace improvizate
- **salvatorii trebuie să se asigure că nici o victimă provenită dintr-un accident din care au rezultat decedați la locul accidentului sau pacienți cu injurii serioase nu va părăsi locul accidentului înainte de sosirea echipelor medicale**